

# THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2023

(V/v thông tin thuốc **VAROGEL S**)

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **VAROGEL S** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

Thành phần hoạt chất, hàm lượng: Mỗi gói 10ml chứa  
(Nhôm hydroxyd, Magnesi hydroxyd )

1. Nhóm dược lý: Thuốc kháng acid và chống đầy hơi
2. Dạng bào chế: hỗn dịch uống

## I. Dược động học.

- Nhôm Hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydroclorid để Trănạo thành nhôm clorid và nước. Khoảng 17-30% nhôm clorid được tạo thành được hấp thu và nhanh chóng thải trừ qua thận ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường.
- Magnesi hydroxyd nhanh chóng phản ứng với acid hyclorid để tạo thành Magnesi clorid và nước. Khoảng 15-30% Magnesi clorid tạo thành hấp thụ và nhanh chóng thải trừ qua thận ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường.

## II. Dược lực học

Varogel S là thuốc kháng acid có thành phần nhôm hydroxyd, magnesi hydroxyd. nhôm hydroxyd, magnesi hydroxyd tan trong acid dịch vị, giải phóng các anion có tác dụng trung hòa acid dạ dày. Hoặc làm chất đệm cho acid dạ dày, nhưng không tác động đến sự sản sinh ra acid dạ dày. Thuốc làm giảm triệu chứng tăng acid dạ dày, giảm độ acid trong thực quản và làm ức chế tác dụng tiêu

protid của men pepsin; tác dụng này rất quan trọng ở người bệnh loét dạ dày. Magnesi hydroxyd còn có tác dụng nhuận tràng nên làm giảm tác dụng gây táo bón của nhôm hydroxyd.

### **III. Chỉ định**

- Viêm loét dạ dày- tá tràng cấp, mạn tính.
- Triệu chứng tăng tiết acid dạ dày ( nóng rát, ợ chua...), hội chứng dạ dày kích thích.
- Trào ngược dạ dày- thực quản.

### **IV. Liều dùng.**

- Viêm loét dạ dày- tá tràng cấp, mạn tính: 10ml ( 1 gói )x 2-4 lần/ ngày.
- Triệu chứng tăng tiết acid dạ dày ( nóng rát, ợ chua...), hội chứng dạ dày kích thích, Trào ngược dạ dày- thực quản: 10ml ( 1 gói )x 2-4 lần/ ngày.

### **V. Cách dùng.**

- Lắc kỹ trước khi dùng thuốc.
- Uống giữa các bữa ăn hoặc sau khi ăn 30 phút - 2 giờ, buổi tối trước khi đi ngủ hoặc khi có triệu chứng.

### **VI. Chống chỉ định.**

- Bệnh nhân mẫn cảm với Varogel S hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Suy thận nặng
- Bệnh nhân giảm phosphat máu

- Bệnh nhân tăng magnesi máu

## **VII. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.**

### **Phụ nữ mang thai:**

- Nhìn chung các thuốc antacid được coi là an toàn, miễn là không dùng lâu dài và liều cao.

### **Phụ nữ cho con bú:**

- Chưa có tài liệu nào ghi nhận tác dụng phụ của thuốc, tuy thuốc có thải trừ qua sữa nhưng chưa đủ để gây tác dụng phụ cho trẻ em bú sữa mẹ.

## **VII. Tương tác thuốc.**

Dùng chung với các thuốc: Tetracyclin, isoniazid, allopurinol, corticoid.... có thể làm giảm hấp thu các thuốc này. Cần uống các thuốc này cách xa thuốc Varogel S.

