

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2023

(V/v thông tin thuốc **DESLOMEYER**)

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **DESLOMEYER** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

Thành phần hoạt chất, hàm lượng: Mỗi gói chứa Desloratadin 2,5mg)

1. Nhóm dược lý: Thuốc kháng Histamin
2. Dạng bào chế: gói 5ml.

I. Dược động học.

- Thời gian bắt đầu tác dụng: 1 giờ, thời gian đạt đỉnh tác dụng: 3 giờ, duy trì tác dụng 24 giờ.
- Chuyển hóa ở gan thành chất chuyển hóa có hoạt tính là 3-hydroxydesloratadin.
- Thải trừ theo con đường liên hợp với acid glucuronic.
- Ở liều điều trị desloratadin không ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng bởi hệ thống enzym chuyển hóa CYP ở gan.
- Thời gian bán thải 27 giờ, thải trừ qua nước tiểu, qua phân.

II. Dược lực học

- Desloratadin là chất chuyển hóa chính có tác dụng của loratadin.
- Một thuốc kháng histamin ba vòng thế hệ 2, ít có tác dụng ức chế TKTW hơn thế hệ 1.
- Thuốc có tác dụng kháng chọn lọc thụ thể H₁ ngoại biên, làm giảm kéo dài triệu chứng của dị ứng, như: viêm mũi

dị ứng, mày đay.

- Desloratadin có thể dùng một mình hoặc phối hợp với một thuốc chống xung huyết như peseudophedrin sulfat.

III. Chỉ định

- Giảm triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, sung huyết/ nghẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.
- Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như giảm ngứa, giảm kích cở, số lượng ban.

IV. Liều dùng.

- Deslomeyer được dùng bằng đường uống, một lần một ngày, không bị ảnh hưởng bởi thức ăn:
 - Trẻ em từ 1- 5 tuổi: 2,5 ml, 1 lần/ ngày.
 - Trẻ em từ 6 -11 tuổi: 5ml, 1 lần/ ngày.
 - > 12 tuổi: 10ml, 1 lần/ ngày.
 - Bệnh nhân suy gan, suy thận, liều dùng Deslomeyer được khuyến cáo là 10 ml, uống cách ngày.
 - ***Trường hợp liều dùng 2,5ml/lần. Nên sử dụng thuốc đóng chai kèm theo cốc đồng có chia vạch.***

V. Chống chỉ định.

- Bệnh nhân mẫn cảm với Desloratadin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc

VI. Thận trọng.

- Desloratadin thải trừ qua thận dưới dạng chất chuyển hóa còn hoạt tính, do đó cần giảm liều trên bệnh nhân suy thận. Tương tự cũng giảm liều cho bệnh nhân suy gan.

Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú

- **Phụ nữ có thai:** Mặc dù nghiên cứu trên động vật cho thấy desloratadin không gây quái thai, song cũng nên thận trọng desloratadin cho phụ nữ có thai.
- **Phụ nữ cho con bú:** desloratadin qua được sữa mẹ, vì thế không khuyến cáo sử dụng desloratadin phụ nữ cho con bú.

VI. Tương tác thuốc.

- Desloratadin làm tăng nồng độ và tăng tác dụng của rượu, thuốc ức chế TKTW, thuốc ức chế thu hồi serotonin.

